



ថ្ងៃមិនស្រួលខ្លួន និងរោគទឹកនោមផ្អែម

ថ្ងៃមិនស្រួលខ្លួនអាចធ្វើឲ្យពិបាកទប់ទល់ជាតិស្ករក្នុងឈាម ។ ត្រូវរៀបចំផែនការជាមុន ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែមដែលត្រូវការ នៅពេលអ្នកមិនស្រួលខ្លួន ។

នៅពេលអ្នកមិនស្រួលខ្លួន :

- ពិសោធដើលជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ (ពី 4 ទៅ 6 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ) ។ ទូរស័ព្ទទៅមន្ទីរពិនិត្យរោគរបស់អ្នក បើសិនជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នក មានលើសហួសពីកំរិតធម្មតារបស់អ្នក ។
- នៅតែចាក់ថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីន ឬលេបថ្នាំគ្រាប់របស់អ្នកជាបន្តទៀត ទោះបីជាអ្នកពុំអាចបរិភោគអ្វីបានក៏ដោយ គឺលុះត្រាណាតែគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកគាត់ប្រាប់មិនឲ្យអ្នកធ្វើ ។
- ផឹកវត្សរៗឲ្យបានច្រើន ។ ផឹកទឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយកែវ ឬវត្សរៗផ្សេងទៀតដែលគ្មានជាតិស្ករ ឬគ្មានជាតិកាហ្វ៊ីន ជារៀងរាល់ម៉ោង ។ បើសិនជាក្រពះរបស់អ្នកមិនស្រួល សូមផឹកទឹកតែបន្តិចដើម្បីជួយកុំឲ្យក្អួតចង្ហោរ ។
- បើអ្នកពុំអាចបរិភោគតាមពេលធម្មតារបស់អ្នកបាន នោះត្រូវបរិភោគអ្វីដែលមានជាតិម្សៅនិងជាតិស្ករ (ដូចជាទំពុំ និងផ្លែឈើ) ជាមួយនឹងវត្សរៗដែលមានជាតិស្ករ (ទឹកផ្លែឈើ និងភេសជ្ជៈធម្មតា) ។
- ព្យាយាមបរិភោគ ឬផឹកទឹកជាតិកាហ្វ៊ីនហែដ្រេតចំនួន 10-15 ក្រាម ជារៀងរាល់ម៉ោង ឬចំនួន 50 ក្រាមនៅរាល់ពេលដែលអ្នកខានពិសាអាហារ ទោះបីជាអ្នកពុំពង្រីកក្អួតចង្ហោរក៏ដោយ ។

ម្ហូបនិងទឹកដែលមានជាតិកាហ្វ៊ីនហែដ្រេតចំនួន 10-15 ក្រាម :

- នំក្រែកខ្លីប្រហែល 6
- ទឹកស្អុយ 1 ពែង
- ការបីមកី ½ ពែង
- ទឹកដោះគោ 1 ពែង
- ទឹកស្វដាធម្មតា ½ ពែង
- ទឹកផ្លែឈើគ្មានជាកស្ករ ½ ពែង

- សូមសាកសួរក្រុមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក អំពីឈ្មោះវត្ថុដែលគ្មានជាតិស្ករ គ្មានជាតិស្រា ឬថ្នាំពេទ្យដែលអាចទិញមិនចាប់មានសំបុត្រពេទ្យ ដូចជាថ្នាំក្អួក និងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលត្រឹមត្រូវសំរាប់ឲ្យអ្នកលេប បើសិនជាត្រូវការ ។



Sick Days and Diabetes

Sick days can make blood sugar hard to control. Plan ahead with your doctor to take the extra steps needed when you are sick.

While you are sick:

- Test your blood sugar more often (4 to 6 times a day). Call your clinic if your blood sugar is out of your usual range.
- Keep taking your insulin or diabetes pills, even if you cannot eat, unless your doctor says not to.
- Drink plenty of liquids. Drink at least one cup of water or other sugar free, caffeine-free liquid each hour. If you are sick to your stomach, take the liquids in small sips to help avoid throwing up.
- If you cannot eat your usual meals, replace solid foods that contain starch and sugar (such as bread and fruit) with liquids that contain sugar (fruit juice and regular soft drinks).
- Try to eat or drink 10-15 grams of carbohydrate each hour or 50 grams for every meal missed, even if you are vomiting.

Foods and drinks that have 10-15 grams of carbohydrates:

- Saltine crackers, 6
- Soup 1 cup
- Ice cream ½ cup
- Milk 1 cup
- Regular soda pop ½ cup
- Unsweetened fruit juice ½ cup

- Ask your healthcare team about the names of sugar-free, non-alcoholic, over-the-counter medications, such as cough medicine and pain relievers that are o.k. to take if needed.